

# បញ្ឈប់ការដក់បារី

មិនត្រូវដក់បារីនៅមុន ឬក្រោយ  
កំណើតទារករបស់អ្នក និងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យ អ្នកដ  
ទៃទៀតដក់បារីនៅជុំវិញទារករបស់អ្នកឡើយ។

# សីតុណ្ហភាពប្រចាំបន្ទប់

សូមស្លៀកពាក់ឲ្យទារករបស់អ្នកនៅក្នុង  
សំលៀកបំពាក់គេងស្រាល និងត្រូវរក្សាបន្ទប់  
នៅសីតុណ្ហភាពដែល  
ងាយស្រួលសំរាប់មនុស្សពេញវ័យ។

# ហាមផ្ទៃទន់លឿយ

ទារកទាំងឡាយមិនត្រូវបានដាក់  
ឲ្យគេងនៅលើគ្រែទឹក សាឡុង  
ឬផ្ទៃទន់លឿយផ្សេងទៀតឡើយ។

# ពេលសំរាប់ក្រពះ

ត្រូវផ្តល់ "ពេលសំរាប់ក្រពះ" នៅពេលទារក  
របស់អ្នកភ្ញាក់ពីគេង និងត្រូវបានមើលថែទាំ។

# ការប្រើប្រាស់ក្បាលដោះជ័រ

ការបំបោះកូនដោយទឹកដោះ គឺល្អបំផុត។  
បន្ទាប់ពីការបំបោះកូនដោយទឹកដោះត្រូវបានធ្វើឡើង  
ចូលផ្តល់ឲ្យទារករបស់អ្នកនូវក្បាលដោះជ័រមាន  
អនាម័យមួយ អំឡុងពេលគេង។

# ការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ

ត្រូវប្រាកដថាទារករបស់អ្នកទទួលបាននូវ  
ការពិនិត្យសុខភាព និងការចាក់ថ្នាំបង្ការរៀងទាត់។

# ហេតុអ្វី?

វាគឺសំរាប់ទារកទាំងឡាយ!

# តើការគេងដែលមានសុវត្ថិភាព មានលក្ខណៈដូចម្តេច?



ចំពោះព័ត៌មានស្តីពីការគេងដែលមានសុវត្ថិភាព  
សំរាប់ទារក សូមមើលគេហទំព័ររបស់  
ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋផែនស៊ីរ៉ាសៀ តាម  
[www.health.state.pa.us/pasids](http://www.health.state.pa.us/pasids)



សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ S.I.D.S. of PA/Cribs for Kids



កាត់បន្ថយ ហានិភ័យនៃ  
ពោគសញ្ញាការស្លាប់ភ្លាមៗរបស់  
សទារក (SIDS)

និង  
ការស្លាប់ដោយសារ  
ការថប់ដង្ហើមចៃដន្យ

របស់ទារកអ្នកក្នុងអំឡុងពេលគេង





# វាមានភាពងាយស្រួលដូចជា A, B, C



## នៅម្នាក់ឯង

សូមរក្សា

កន្លែងគេងរបស់ទារកអ្នកនៅជិត  
ប៉ុន្តែ ញែកដាច់ពីកន្លែងគេង  
ដែលអ្នកផ្សេងទៀតគេង។  
ទារករបស់អ្នកមិនគួរ  
គេងនៅលើគ្រែ នៅលើ  
កន្លែងទំរេត ឬនៅក្នុងកៅអី  
ជាមួយដទៃទៀតឡើយ។



## ខ្ទង គឺល្អបំផុត

ទារករបស់អ្នកគួរ គេងផ្ទះ  
នៅក្នុងគ្រែសំរាប់ទារក  
ដែលបានយល់ស្របថាមានសុវត្ថិភាព  
នៅលើពួកមិនស្រួតជារៀងរាល់ពេល  
ដែលអ្នកដាក់ពួកគេចុះ ឲ្យគេង ដែលរួមបញ្ចូល  
ចូលទាំងការគេងពេលថ្ងៃផងដែរ។



## នៅក្នុង គ្រែសំរាប់ទារក

### ដែលមិនរាយប៉ាយ

ត្រូវផ្លាស់ចេញនូវរាល់កម្រាលរលុង  
រត់ធ្វើឲ្យសុខស្រួល  
សំពត់ក្រាលកន្លែងគេង  
ស្បែករោមសត្វចៀម  
សត្វជាសំភារៈលេង  
កម្រាលទ្រាប់គ្រែ និងខ្នើយចេញពី  
គ្រែទារករបស់អ្នក។



## មូលហេតុ នៃការស្លាប់

SIDS និង

ការស្លាប់ដោយសារការថប់ដង្ហើម  
ដោយចៃដន្យ គឺជាមូលហេតុនាំមុខ  
នៃការស្លាប់ចំពោះទារក អាយុ 1 ទៅ  
12 ខែ។



## អាយុ ប៉ុន្មានខែ

ទារកដែលមានអាយុពី 2 ទៅដល់ 4 ខែ  
គឺស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់  
សំរាប់ SIDS និងការស្លាប់ដោយសារ  
ការថប់ដង្ហើមចៃដន្យ។



## ប្រាប់ អ្នកផ្សេងទៀត

ឲ្យចែករំលែកវិធីសាស្ត្រ  
A, B, C, 1, 2, 3

យ៉ាងហោចណាស់ជាមួយមនុស្សឲ្យបាន  
3 នាក់។ ការអប់រំ គឺជាគន្លឹះ  
ចំពោះការរក្សាទារកឲ្យមានសុវត្ថិ  
ថិភាព។